

Résultats de l'enquête MICS 4 en Mauritanie 



La Vie des Femmes et des Enfants en Mauritanie

Édition pour les jeunes enfants et les mamans
Bilingue français - arabe



A propos de ce livre

- Ce livre présente les principaux résultats d'une enquête menée en Mauritanie pour comprendre la situation des femmes et des enfants dans le pays. L'enquête a été réalisée de juin à septembre 2011 auprès de 11.116 ménages, de 12.754 femmes âgées de 15 à 49 ans et des mères/gardiennes d'enfants de 9.278 enfants de moins de 5 ans.
- L'enquête mesure les progrès réalisés pour la situation des femmes et des enfants en Mauritanie en vue d'atteindre les Objectifs du *Millénaire pour le Développement* et du plan d'action d'un *Monde Digne des Enfants*.



Cette enquête sur la vie des femmes et des enfants en Mauritanie est importante pour tout le monde. Ce livre a été développé pour faire connaître les résultats de l'enquête auprès des enfants, des mamans, des papas, des familles, des maîtres d'écoles, des chefs religieux, des chefs de communauté... Tout le monde peut utiliser ce livre.



- Cette enquête (appelée MICS, de l'anglais « Multiple Indicator Cluster Survey ») est élaborée par l'UNICEF et réalisée dans plusieurs pays. En Mauritanie, elle a été réalisée par l'Office National de la Statistique avec l'appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP/UNFPA). Il s'agit de la 4^{ème} édition de l'enquête, le précédent MICS ayant été réalisé en 2007.
- Ce livre a été publié en mai 2013 à l'initiative de l'UNICEF. L'information contenue dans ce livre peut être reproduite avec l'accord de l'UNICEF.
- Ce document a été réalisé avec l'appui de Marie Bombart de P&G

Contact UNICEF:

Brahim Ould Isselmou – Spécialiste communication

Nouakchott, Mauritanie

Téléphone: (+222) 45 29 98 03

E-mail: bouldisselmou@unicef.org





AGENDA



L'EAU ET L'HYGIÈNE

- | | |
|--|---|
| 1. Boire de l'eau améliorée ou traitée | 3 |
| 2. Se laver les mains au savon | 5 |
| 3. Utiliser des latrines améliorées..... | 7 |

SE SOIGNER, ÊTRE EN FORME

- | | |
|---|----|
| 4. Bien Manger et éviter la malnutrition..... | 9 |
| 5. Être à jour dans les vaccinations..... | 11 |
| 6. Soigner les diarrhées | 13 |
| 7. Lutter contre le paludisme..... | 15 |
| 8. Comprendre le Sida..... | 17 |

SE MARIER ET AVOIR DES ENFANTS

- | | |
|--|----|
| 9. Eviter le mariage précoce, connaître la contraception | 19 |
| 10. Bien mener la maternité et l'accouchement | 21 |
| 11. Allaiter son bébé jusqu'à 6 mois | 23 |
| 12. Allaiter et nourrir son bébé de 6 mois à 2 ans | 25 |

S'INSTRUIRE ET SE PROTÉGER POUR UN MEILLEUR FUTUR

- | | |
|--|----|
| 13. Éduquer les enfants dès le plus jeune âge..... | 27 |
| 14. Aller à l'école | 29 |
| 15. Abandonner les mutilations génitales féminines | 31 |
| 16. Dire non à la violence contre les enfants..... | 33 |

- | | |
|--|-----------|
| Annexe: tableau avec les principaux résultats | 35 |
|--|-----------|

1. Boire de l'eau améliorée ou traitée

Pourquoi boire de l'eau traitée ou provenant de sources améliorées?

L'eau de boisson provenant de sources d'eau améliorée ou l'eau traitée nous protège des maladies liées à l'eau comme les diarrhées, le choléra et d'autres maladies infectieuses.


Les sources d'eau améliorées (l'eau n'est pas en contact avec l'extérieur):




Château d'eau




Pompe manuelle



Borne fontaine



Puits couvert



Robinet

Les chiffres en Mauritanie: tout le monde n'a pas accès aux sources d'eau améliorée ou à l'eau traitée


1 ménage sur 2 utilise une source améliorée d'eau de boisson (53%)



1 ménage sur 3 qui n'a pas accès à une source d'eau améliorée traite l'eau de boisson (29%)



Qu'est-ce que je peux faire?



Je bois seulement de l'eau provenant de sources améliorées ou de l'eau traitée

Tu peux traiter l'eau en la faisant bouillir, en utilisant de la javel ou avec la méthode de désinfection solaire (SODIS)

Faire bouillir




Javelliser



1 cuillère à café de javel pour un bidon de 20 litres. Laisser reposer 20 minutes avant de boire

Traitement solaire



Laisser la bouteille au soleil toute une journée



Je couvre bien le puits après l'avoir utilisé

2. Se laver les mains au savon


Pourquoi faut-il se laver les mains au savon?

Les mains sont porteuses de microbes qui peuvent nous rendre malades (diarrhée, pneumonie...). Le lavage des mains au savon stoppe la transmission des maladies.




Les chiffres en Mauritanie: tout le monde n'a pas un endroit ou du savon pour se laver les mains


Sur 10 foyers,



3 foyers sur 10 ont un endroit pour se laver les mains et du savon (33%)



3 foyers sur 10 ont un endroit pour se laver les mains **mais pas de savon** (27%)




4 foyers sur 10 n'ont **pas d'endroit** pour se laver les mains et **pas de savon** (40%)



Qu'est-ce que je peux faire?

Il faut se laver les mains:

1. Après avoir utilisé les latrines
2. Après tout contact avec les selles (bébé, personne malade)
3. Avant de donner à manger à l'enfant
4. Avant de préparer le repas
5. Avant de manger



Si tu n'as pas de savon pour te laver les mains, tu peux aussi les laver à la cendre



3. Utiliser des latrines améliorées

Pourquoi faut-il des latrines et toilettes améliorées?

L'évacuation inadéquate d'excréments humains entraîne une série de maladies dont la diarrhée, le choléra, la polio...

On peut facilement se protéger en utilisant des toilettes et latrines aménagées qui séparent de façon hygiénique les excréments humains du contact humain (chasse d'eau connectée à un système d'égout, fosse septique, latrine améliorée...)




Les chiffres en Mauritanie: tout le monde n'a pas accès à des toilettes ou latrines construites

2 ménages sur 5 (41%) ne disposent d'aucune forme de toilette et pratiquent la défécation à l'air libre qui entraîne des risques importants de maladies et de contamination



Qu'est-ce que je peux faire?



Utilise toujours les toilettes ou latrines améliorées

J'encourage les autres parents pour qu'ils construisent des latrines à la maison et à l'école



Après être allé aux toilettes, je me lave toujours les mains à l'eau et au savon

4. Bien manger et éviter la malnutrition

Bien manger est essentiel, notamment pour les enfants

Les enfants sous-alimentés (même légèrement) sont plus susceptibles de souffrir des maladies courantes de l'enfance. Ceux qui survivent ont des maladies récurrentes et accusent un retard de croissance.

Les enfants ont donc besoin de bien manger. Il faut les amener au centre de santé pour suivre leur croissance et leur procurer des compléments alimentaires si besoin.



Pour couvrir tous les besoins nutritionnels, il est important aussi de consommer du sel iodé et d'avoir de bons apports en vitamine A.

Les chiffres en Mauritanie: les enfants ont besoin de manger plus et mieux

1 jeune enfant sur 4 (24%) est sous-alimenté et ne pèse pas assez par rapport à son âge




Moins d'1 ménage sur 10 (7%) consomme du sel iodé



4 jeunes enfants sur 5 (79%) reçoivent des suppléments de vitamine A




Qu'est-ce que je peux faire?




Amène le bébé se faire peser au centre de santé. Ils donneront des aliments énergétiques pour le soigner si le bébé présente des signes de malnutrition

Procure-toi du sel iodé, essentiel pour le développement physique et mental des enfants. Si quelqu'un a un goitre, c'est qu'il a une carence en iode



Mange des aliments riches en vitamine A (lait, légumes verts, fruits, œufs...). La vitamine A est essentielle pour la santé oculaire et le bon fonctionnement du système immunitaire



Il y a de la vitamine A au centre de santé. Les enfants de moins de 5 ans doivent prendre 2 fois par an des suppléments de vitamine A



5. Être à jour dans les vaccinations

Vacciner en priorité les bébés de moins de 1 an et les femmes enceintes

La vaccination est très importante pour éviter les maladies. Dès la naissance, les bébés ont besoin de plusieurs vaccinations pour lutter contre la polio, la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et l'hépatite B.

Les femmes enceintes ou en âge d'avoir un bébé doivent être vaccinées contre le tétanos pour être protégées au moment de l'accouchement et protéger le nouveau-né contre le tétanos néonatal.



Les chiffres en Mauritanie: tout le monde n'est pas bien vacciné

Seulement 2 bébés sur 5 (38%) reçoivent tous les vaccins prévus



1 femme enceinte sur 2 (56%) est protégée contre le tétanos



1 enfant sur 3 (32%) a un carnet de vaccination



Qu'est-ce que je peux faire?



Il faut se rendre au centre de santé ou aller à la rencontre des unités de vaccinations mobiles pour se faire vacciner et faire vacciner les bébés

Assure-toi que les enfants autour de toi sont tous vaccinés contre toutes les maladies invalidantes, en particulier les bébés de moins de 1 an



Ne perds pas ton carnet de vaccinations, il permet aux médecins et aux infirmiers de savoir si tu as besoin d'un nouveau vaccin ou pas

6. Soigner les diarrhées

Pourquoi et comment surveiller les diarrhées des enfants

Les diarrhées sont responsables de nombreux décès chez les enfants parce que les enfants se déshydratent beaucoup plus vite que les adultes.

L'enfant a la diarrhée quand il fait plus de 2 selles liquides par jour. Il faut rapidement soigner les enfants qui font la diarrhée:

- Avec le sel de réhydratation orale (SRO)
- En lui donnant à boire plus que d'habitude
- En continuant à lui donner à manger ou à l'allaiter



Si la diarrhée dure plus de 3 jours ou si elle est associée à des vomissements ou s'il y a des traces de sang dans les selles de l'enfant, il faut amener rapidement l'enfant au centre de santé.

Les chiffres en Mauritanie: les enfants ne sont pas toujours bien soignés quand ils font la diarrhée

Seulement 1 enfant qui fait la diarrhée sur 3 (33%) reçoit le sel de réhydratation orale ou davantage de liquides avec poursuite de l'alimentation



Qu'est-ce que je peux faire?



Pour éviter la diarrhée,
Lave-toi les mains avec du savon
Bois de l'eau traitée ou provenant
d'une source améliorée

Lorsqu'un enfant a la
diarrhée, je lui donne
beaucoup d'eau ainsi que
le Sel de réhydratation
orale



Je continue à alimenter mon
bébé et mes enfants quand ils
ont la diarrhée

Nous amenons rapidement au
centre de santé les enfants qui
ont des traces de sang dans les
selles




7. Lutter contre le paludisme

Pourquoi faut-il dormir sous les moustiquaires imprégnées?

Le paludisme est très dangereux, surtout pour la femme enceinte, les bébés et les enfants.


Pour l'éviter, il faut se protéger des piqûres des moustiques en se mettant toutes les nuits sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide dès le coucher du soleil.

Si un enfant a de la fièvre, il faut lui faire un test de paludisme au centre de santé.



Les chiffres en Mauritanie - dans les zones à forte transmission de paludisme: tout le monde n'a pas de moustiquaire imprégnées, et ceux qui en ont ne les utilisent pas toujours


3 ménages sur 5 (58%) possèdent au moins une moustiquaire imprégnée



Seulement 1 enfant ou 1 femme enceinte sur 5 dorment tous les soirs sous une moustiquaire imprégnée (24% des enfants de moins de cinq et 29% des femmes enceintes)



Qu'est-ce que je peux faire?



Moi et mon bébé, nous dormons toutes les nuits sous une moustiquaire imprégnée, dès le coucher du soleil

Moi, mes frères et mes sœurs, nous dormons sous moustiquaire imprégnée tous les soirs

Je prends des comprimés qui m'empêchent d'attraper le paludisme depuis le 3ème mois de ma grossesse



J'amène mon enfant au centre de santé car il a de la fièvre. Ils vont lui faire un test de paludisme et le traiter contre le paludisme si besoin

8. Comprendre le SIDA

Comment attrape-t-on le Sida? Comment s'en protéger?

Le Sida peut être traité mais pas complètement soigné. Il faut donc tout faire pour s'en protéger.

Le Sida peut être transmis par:

1. Des relations sexuelles non protégées avec une personne infectée,
2. L'échange de sang avec une personne infectée (transfusion, blessure, seringue...),
3. Les mères porteuses du Sida qui transmettent la maladie à leur nouveau né.

On peut se protéger du Sida:

1. En ayant un seul partenaire sexuel sain, ou en utilisant un préservatif à chaque relation,
2. En utilisant seulement des instruments médicaux neufs ou désinfectés.

Les femmes enceintes atteintes du sida doivent prendre des précautions pendant l'accouchement et en allaitant le bébé.

Partager de la nourriture ou serrer la main d'une personne atteinte du sida ne transmet pas le sida. Les piqûres de moustiques ne transmettent pas le sida.

Il ne faut pas discriminer les personnes qui sont infectées par le sida.

Les chiffres en Mauritanie: tout le monde ne connaît pas bien la maladie

1 femme sur 3 (29%) sait qu'on évite le SIDA en ayant un partenaire sexuel fidèle non infecté ou en utilisant un préservatif à chaque rapport sexuel



1 femme sur 3 (30%) sait qu'elle peut faire le test de dépistage du SIDA dans un centre de santé




Qu'est-ce que je peux faire?



Renseigne-toi sur le Sida dans les centres de santé

Je discute avec mes amies et mes enfants pour qu'ils comprennent bien ce qu'est le sida et comment l'éviter



Pour éviter le Sida, utilise un préservatif à chaque relation sexuelle avec une personne infectée

Rends-toi dans ton centre de santé pour faire un test anonyme



9. Éviter le mariage précoce, connaître la contraception

Éviter le mariage précoce

Dans certaines sociétés, les filles sont mariées trop jeunes. Mais la jeune fille ne doit pas être mariée très tôt, elle doit d'abord aller à l'école pour être instruite. Une fille instruite est une future mère éveillée.



Connaître la contraception, les moyens d'espacement des naissances



Une fois mariée, il est important de connaître les moyens de contraception pour prévenir les grossesses trop précoces, trop rapprochées ou trop tardives. Donner naissance avant 18 ans est un risque médical pour une femme.

Les chiffres en Mauritanie: des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, et même avant 15 ans

Le mariage avant 15 ans

1 femme sur 7 (15%) a été mariée avant l'âge de 15 ans

Avant
15 ans

Après
15 ans

Le mariage avant 18 ans

2 femmes sur 5 (37%) ont été mariées avant l'âge de 18 ans

Avant
18
ans

Avant
18
ans

Après
18 ans

Après
18 ans

Après
18 ans


Peu de femmes utilisent des méthodes de contraception

Seulement 1 femme sur 10 (11%) utilise une méthode de contraception



Qu'est-ce que je peux faire?

Demande à tes parents de finir ta scolarité avant de te marier



Tu peux parler des moyens de contraception lorsque tu vas au centre de santé, ou alors avec des amies



10. Bien mener la maternité et l'accouchement

Pourquoi se faire suivre par du personnel de santé

Les femmes enceintes doivent effectuer au moins 4 visites prénatales et accoucher dans un centre spécialisé pour être accompagnées d'un personnel de santé qualifié.

Lors des visites prénatales, les femmes enceintes recevront un suivi spécialisé, un vaccin anti-tétanos pour se protéger elle et son bébé le jour de l'accouchement, des vitamines ainsi que des pilules contre le paludisme si elle est dans une zone à risque.

Une femme enceinte doit bien s'alimenter pour avoir un bébé en bonne santé.



Les chiffres en Mauritanie: plus de femmes pourraient bénéficier d'un bon suivi médical durant leur grossesse

1 femme enceinte sur 2 (48%) a effectué au moins quatre visites prénatales avec un personnel qualifié (médecin, infirmière ou sage-femme)




2 naissances sur 3 (65%) ont lieu dans une structure de santé. 1 naissance sur 3 se produit à domicile



3 naissances sur 5 (59%) sont enregistrées à l'état civil



Qu'est-ce que je peux faire?



Pendant mes grossesses, je fais au moins 4 visites prénatales avec du personnel qualifié

Pour l'accouchement, il faut se rendre dans une structure de santé



Les bébés doivent être enregistrés à l'état civil: cela leur donnera des droits pour plus tard

11. Allaiter son bébé jusqu'à 6 mois

Pourquoi l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois?

Le lait maternel est le meilleur aliment pour le nouveau-né: il le nourrit, le protège contre les maladies et contient tout ce qu'il faut pour une bonne croissance.

La maman doit mettre son bébé au sein dans la première heure qui suit l'accouchement: le tout premier lait (le colostrum, lait jaune) est très bon pour le bébé.

Il ne faut pas donner de l'eau au bébé avant 6 mois, ni d'autres liquides, ni des aliments solides.



Les chiffres en Mauritanie: plus de mamans pourraient pratiquer l'allaitement exclusif

Une femme sur 2 (56%) met son bébé au sein moins d'une heure après la naissance



Au total, seul un quart (27%) des bébés de moins de six mois sont nourris exclusivement au sein



Qu'est-ce que je peux faire?



Jusqu'à 6 mois, je nourris mon bébé exclusivement au lait maternel. Je le nourris à la demande, de jour comme de nuit

Je commence à donner le sein dans l'heure qui suit l'accouchement



Il ne faut pas donner d'eau à un bébé, même pas l'eau du marabout

Je bois et je mange bien pendant que j'allaite. Je nourris mon bébé à chaque fois que j'ai soif, lui aussi a certainement soif. Plus j'allaite mon bébé et plus j'aurai du lait




12. Allaiter et nourrir son bébé de 6 mois à 2 ans

Pourquoi donner du lait mais aussi l'alimentation de complément après 6 mois

Après 6 mois, le lait de la mère ne couvre plus entièrement les besoins alimentaires du bébé. Il faut le compléter par d'autres aliments.

- A partir du 7ème mois, en plus de l'allaitement, on commence à lui donner des aliments écrasés et de la bouillie enrichie.
- A partir du 13ème mois, on donne de la nourriture écrasée comprenant des farines, des fruits et légumes, du poisson ou de la viande.

Les aliments doivent être préparés dans de bonnes conditions hygiéniques.



Les chiffres en Mauritanie: les bébés mauritaniens de plus de 6 mois ont besoin de plus d'aliments solides en plus du lait

1 bébé de 6-8 mois sur 2 (48%) a déjà reçu des purées ou bouillies



1 enfant de 6-23 mois sur 5 (19%) reçoit des aliments assez souvent dans la journée







Qu'est-ce que je peux faire?

En plus d'allaiter, je nourris mon bébé avec des aliments
(2 fois par jour pour les 6-8 mois, 3 fois par jour pour les 9-11 mois)

Je donne 2 goûters en plus aux enfants de plus d'un an



Pour rendre la nourriture de bébé plus nutritive, j'y ajoute de l'huile, du sucre, du miel, des légumes, des céréales, du lait, des œufs, des petits morceaux de poisson ou de viande ou des fruits de saison



13. Éduquer les enfants dès le plus jeune âge

Pourquoi éduquer les enfants dès qu'ils sont bébés

Dans de nombreuses familles, il n'y a pas de dialogue entre les parents et leurs enfants alors que le dialogue permet à l'enfant de s'éveiller: la période de développement rapide du cerveau a lieu dans les 3-4 premières années de la vie.



- Parler avec l'enfant permet de développer son langage,
- Demander à l'enfant son avis développe sa confiance en lui,
- Répondre à ses questions stimule sa curiosité et développe son intelligence,
- Raconter des histoires aux enfants développe leur aptitude à l'écoute, leur capacité de raisonnement et leur transmet des valeurs culturelles.

Les chiffres en Mauritanie: tous les enfants n'ont pas accès à l'éveil

2 jeunes enfants sur 5 (40%) disposent d'au moins 2 jouets à la maison



Très peu de mamans (6%) utilisent des livres d'enfants



1 enfant sur 4 (26%) est laissé parfois avec une garde inadéquate (seul ou à la garde d'autres enfants)



Qu'est-ce que je peux faire?



Je joue avec mon enfant, je lui donne des jouets et je réponds à ses questions

Je raconte des histoires à mes enfants, dès leur plus jeune âge




Je lis des livres aux bébés et aux enfants

14. Aller à l'école

Pourquoi les filles et les garçons doivent aller à l'école

L'éducation est la base d'un meilleur avenir pour les filles et les garçons, pour leurs futurs enfants, ainsi que pour toute la communauté. Les enfants doivent donc aller à l'école.



La jeune fille doit aller à l'école au même titre que le jeune garçon. La jeune fille ne doit pas être mariée trop tôt, elle doit d'abord aller à l'école.

Les chiffres en Mauritanie: tout le monde ne sait pas lire et écrire car tout le monde ne va pas à l'école

3 jeunes femmes sur 5 sont alphabétisées (57% des 15-24 ans). 1 femme sur 3 (34%) qui est allée à l'école coranique / Mahadra et 1 femme sur 2 (49%) qui est allée jusqu'à l'école primaire sont alphabétisées. Toutes les femmes qui sont allées jusqu'au secondaire sont alphabétisées



3 enfants sur 5 vont à l'école (61% des enfants en âge d'aller à l'école primaire, 57% de ceux en âge d'aller au secondaire)



1 enfant sur 5 travaille (22% des enfants de 5-14 ans), ce qui l'empêche d'aller à l'école ou de bien suivre les cours. On estime qu'un enfant travaille quand il est payé pour son travail ou quand il effectue des tâches domestiques plus de 28 heures par semaine



Qu'est-ce que je peux faire?



Je suis allée dans le préscolaire de 3 à 5 ans, à l'école primaire de 6 à 11 ans et j'irai dans le secondaire à partir de 12 ans

Quand nous avons des tâches ménagères à faire à la maison, nous demandons à les faire avant ou après l'école

J'encourage tous les enfants et leurs parents que je connais pour que leurs enfants aillent à l'école



15. Abandonner les Mutilations Génitales Féminines

Pourquoi dire non aux mutilations génitales féminines

Les mutilations génitales féminines (MGF) ont des conséquences sanitaires graves pour les filles et les femmes: mort, hémorragies, infections urinaires et génitales, stérilité, difficultés lors des accouchements...

Les MGF ne constituent pas une obligation religieuse dans l'Islam. Beaucoup d'Imams mauritaniens ont émis des Fatwa qui prônent l'abandon des MGF.



Les MGF sont des pratiques traditionnelles qui constituent une atteinte aux droits humains. Le gouvernement a adopté et mis en œuvre une stratégie de promotion de l'abandon des MGF.

Les chiffres en Mauritanie: une pratique encore présente mais en recul

2 femmes sur 3 (69% des 15-49 ans) ont subi une forme de MGF



1 fille sur 2 (55% des 0-14 ans) a subi une forme de MGF



Plus de la moitié des femmes (55%) estiment que les MGF doivent être arrêtées



Qu'est-ce que je peux faire?




Il faut arrêter les MGF, elles sont nuisibles à la santé et constituent une atteinte aux droits humains



Les MGF ne sont pas une obligation religieuse. Beaucoup d'Imams mauritaniens ont émis des Fatwa qui prônent l'abandon des MGF

Le gouvernement met en œuvre une stratégie nationale d'abandon volontaire des MGF / de l'excision



16. Dire non à la violence contre les enfants

Pourquoi dire non à la violence contre les enfants

Les enfants doivent être protégés de toute forme de violence physique, verbale ou morale ainsi que de toute forme d'abus et d'exploitation.

Il y a différents types de violences contre les enfants: châtiments corporels, abus sexuels, certaines pratiques traditionnelles comme les MGF, le mariage précoce et le gavage.

Protéger les enfants est le devoir de tout le monde: mères, pères, oncles, tantes, frères, sœurs, grands-parents, responsables de la communauté, gouvernement...

Les chiffres en Mauritanie: des enfants souffrent encore de violence, mais la plupart des mamans sont pour une discipline non violente

4 enfants sur 5 (87%) ont subi diverses sortes de violences



1 enfant sur 4 (28%) est soumis à des châtiments physiques sévères



2 mères sur 3 (64%) pensent qu'il vaut mieux une discipline non violente qu'une punition physique



Qu'est-ce que je peux faire?



Parle à tes parents, tes professeurs ou tout autre adulte des violences que tu aurais subies, sans rien cacher



Avec tes amis, les autres mamans, papas... parle ouvertement des châtiments corporels et des abus sur les enfants qui peuvent avoir lieu à l'école ou à la maison

Engage-toi dans des campagnes de prévention des châtiments corporels et de la violence sur les enfants



Les principaux résultats – MICS 2011

Sujet	Numéro MICS 4	Indicateur OMD	Indicateur	MICS 2011	Unité
MORTALITE DES ENFANTS					
Mortalité des enfants	1.1	4.1	Taux de mortalité infanto-juvénile (avant 5 ans)	118‰	pour mille
	1.2	4.2	Taux mortalité infantile (avant 1 an)	75‰	pour mille
NUTRITION					
Etat Nutritionnel		1.8	<u>Prévalence Insuffisance pondérale (poids pour âge)</u>		
	2.1a		Modérée et grave	24.4%	Pour cent
	2.1b		Sévère (-3D)	8.2%	Pour cent
			<u>Prévalence Retard croissance (taille pour âge)</u>		
	2.2a		Modéré et grave (- 2 SD)	29.7%	Pour cent
	2.2b		Sévère (- 3 SD)	12.6%	Pour cent
			<u>Prévalence Emaciation (poids pour taille)</u>		
	2.3a		Modéré et grave (- 2 SD)	13.9%	Pour cent
	2.3b		Sévère (- 3 SD)	4.0%	Pour cent
	Allaitement et alimentation infantile	2.5		Mise au sein moins d'une heure après la naissance	55.7%
2.6			Allaitement exclusif des moins de 6 mois	26.9%	Pour cent
2.7			Poursuite de l'allaitement à 1 an	85.0%	Pour cent
2.8			Poursuite de l'allaitement à 2 ans	35.5%	Pour cent
Iodation du sel	2.16		Consommation de sel iodé	7.3%	Pour cent
Vitamine A	2.17		Supplémentation en vitamine A (enfants moins de 5 ans)	79.4%	Pour cent
SANTE DE L'ENFANT					
Vaccinations	3.1		Couverture vaccinale contre la tuberculose	90.7%	Pour cent
	3.2		Couverture vaccinale contre la poliomyélite	54.5%	Pour cent
	3.3		Couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DCT)	57.3%	Pour cent
	3.4	4.3	Couverture vaccinale contre la rougeole	63.3%	Pour cent
	3.5		Couverture vaccinale contre l'hépatite B	57.3%	Pour cent
Vaccin antitétanique	3.7		Protection néonatale contre le tétanos	55.7%	Pour cent
Traitement des maladies	3.8		Thérapie par réhydratation orale avec alimentation continue	40.4%	Pour cent
	3.9		Recours aux soins pour pneumonie présumée	43.0%	Pour cent
	3.1		Antibiothérapie de pneumonie présumée	30.4%	Pour cent
Paludisme	3.12		Disponibilité de moustiquaires imprégnées (MI) dans le ménage	45.7%	Pour cent
	3.15	6.7	Enfants de moins de 5 ans dormant sous MI	18.7%	Pour cent
	3.16		Usage de diagnostics du paludisme	5.1%	Pour cent
	3.17		Traitement antipaludique enfants moins de 5 ans donné le même jour ou le jour suivant	8.6%	Pour cent
	3.18	6.8	Traitement antipaludique donné aux enfants de moins de 5 ans	19.7%	Pour cent
	3.19		Femmes enceintes dormant sous MI	22.0%	Pour cent
Eau et Assainissement	4.5		Endroit pour le lavage des mains	56.3%	Pour cent
	4.6		Disponibilité de savon	66.3%	Pour cent

Sujet	Numéro Indicateur		Indicateur	MICS 2011	Unité
	MICS 4	OMD			
EAU ET ASSAINISSEMENT					
Eau et Assainissement	4.1	7.8	Utilisation de source améliorée d'eau de boisson	53.0%	Pour cent
	4.2		Traitement de l'eau	28.8%	Pour cent
	4.3	7.9	Utilisation d'installations sanitaires améliorées	32.3%	Pour cent
	4.4		Elimination hygiénique des matières fécales de l'enfant	20.3%	Pour cent
	4.5		Endroit pour le lavage des mains	56.3%	Pour cent
	4.6		Disponibilité de savon	66.3%	Pour cent
SANTE DE LA REPRODUCTION					
Contraception et besoins non satisfaits	5.2		Maternité précoce	23.6%	Pour cent
	5.3	5.3	Prévalence de la contraception	11.4%	Pour cent
	5.4	5.6	Besoins non satisfaits en contraception	31.1%	Pour cent
Santé maternelle et du nouveau-né	5.5a		Au moins une fois par le personnel qualifié	84.2%	Pour cent
	5.5b		Au moins quatre fois par n'importe quel prestataire	48.4%	Pour cent
	5.7	5.2	Personnel qualifié à l'accouchement	65.1%	Pour cent
	5.8		Accouchement dans une structure de santé	64.5%	Pour cent
Mortalité maternelle	5.13	5.1	Taux de mortalité maternelle (pour 100,000 naissances vivantes)	715	pour 100 000
DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT					
Développement de l'enfant	6.1		Soutien à l'apprentissage	54.5%	Pour cent
	6.4		Matériel d'apprentissage : jouets	40.4%	Pour cent
	6.5		Garde inadéquate	26.1%	Pour cent
EDUCATION					
Alphabétisation et Education	7.1	2.3	Taux d'alphabétisation des jeunes femmes	57.4%	Pour cent
	7.4	2.1	Taux net de scolarisation primaire (ajusté)	61.0%	Pour cent
	7.5		Taux net de scolarisation secondaire (ajusté)	23.7%	Pour cent
	7.7		Taux d'achèvement du primaire	76.4%	Pour cent
	7.8		Taux de transition à l'école secondaire	66.6%	Pour cent
PROTECTION DE L'ENFANT					
Enregistrement des naissances	8.1		Enregistrement des naissances	58.8%	Pour cent
Travail des enfants	8.2		Travail des enfants	21.5%	Pour cent
Mariage précoce et polygamie	8.6		Mariage avant l'âge de 15 ans	14.8%	Pour cent
	8.7		Mariage avant l'âge de 18 ans	37.3%	Pour cent
	8.8		Jeunes femmes âgées de 15-19 ans actuellement mariées ou en union	25.7%	Pour cent
Mutilation génitale féminine/excision (MGF/E)	8.11		Approbation de la MGF/E	40.7%	Pour cent
	8.12		Prévalence de la MGF/E chez les femmes	69.4%	Pour cent
	8.13		Prévalence de la MGF/E chez les filles	54.8%	Pour cent
VIH/SIDA					
VIH/SIDA, connaissance et attitudes	9.1		Connaissance approfondie sur la prévention du VIH	6.4%	Pour cent
	9.3		Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH	39.9%	Pour cent
	9.4		Attitude bienveillante envers les gens vivant avec le VIH	6.2%	Pour cent
	9.5		Femmes qui savent où faire le test VIH	29.6%	Pour cent
	9.6		Femmes ayant subi le test VIH et connaissant les résultats	4.6%	Pour cent
	9.8		Conseils sur le VIH lors des soins prénatals	21.1%	Pour cent
	9.9		Dépistage du VIH lors des soins prénatals	18.9%	Pour cent