

# ANNEXE UN

## INDICATEURS GLOBAUX

Les indicateurs globaux présentés dans les pages qui suivent font partie de la troisième phase des enquêtes MICS. Ces indicateurs ont été retenus parce que les données requises pour leur calcul peuvent être collectées à travers des enquêtes ménages, et parce qu'ils répondent effectivement aux besoins en matière de suivi des objectifs définis dans la Déclaration du Millénaire, la Déclaration et le Plan d'Action pour "Un Monde Digne des Enfants", le Sommet Mondial pour les Enfants, et plusieurs autres engagements mondiaux.

Pour chacun des indicateurs, une brève description du numérateur et du dénominateur est fournie. Les engagements internationaux auxquels chacun des indicateurs se réfère est indiqué en utilisant les abréviations ci-dessous :

WSC	Sommet Mondial pour les Enfants
MDG	Objectifs du Millénaire pour le Développement, et Indicateur (I)
WFFC	Déclaration et Plan d'Action pour "Un Monde Digne des Enfants", Objectifs Principaux (MG) ou Stratégie/Action (SA)
Abuja	Déclaration d'Abuja sur le projet Faire reculer le paludisme en Afrique
UNGASS	Session Spéciale de l'assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA

## DEFINITIONS DES INDICATEURS GLOBAUX

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>SANTE</b>						
1. Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans <sup>1</sup>	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire, pour 1000 naissances vivantes		1	4 I 13	MG A	
2. Taux de mortalité infantile <sup>1</sup>	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire, pour 1000 naissances vivantes		1	4 I 14	MG A	
3. Taux de mortalité maternelle (TMM) <sup>2</sup>	Nombre annuel de décès de femmes suite à des causes liées à la grossesse, c'est-à-dire les décès survenus pendant la grossesse ou dans les 42 jours qui ont suivi la fin de la grossesse	Nombre de naissances vivantes par an (exprimé pour 100 000 naissances vivantes)	2	5 I 16	MG B	
4. Assistance à l'accouchement	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête et qui ont été assistées pendant l'accouchement par un personnel de santé qualifié <sup>3</sup>	Nombre de femmes enquêtées, âgées de 15-49 ans, et qui ont une naissance survénue au cours des 2 années ayant précédé l'enquête <sup>4</sup>	11	5 I 17	MG B SA 6	
5. Accouchement dans une formation sanitaire	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête et qui ont accouché dans une formation sanitaire <sup>3</sup>	Nombre de femmes enquêtées, âgées de 15-49 ans, et qui ont une naissance survénue au cours des 2 années ayant précédé l'enquête <sup>6</sup>			MG B SA 6	
6. Prévalence de l'insuffisance pondérale	Nombre d'enfants de moins de cinq ans qui se situent en-dessous de moins 2 écarts-type (-2 ET) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence du NCHS/WHO (modéré et sévère) et nombre se situant en dessous de moins 3 écarts-type (-3 ET) par rapport à la médiane poids-pour-âge de la population de référence du NCHS/WHO (sévére)	Nombre total d'enfants de moins de cinq ans pesés <sup>7</sup>	3	1 I 4	MG C	

1 Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont obtenus à partir d'une méthode de calcul qui utilise un tableau des nombres de femmes, d'enfants nés vivants et de la proportion des décès selon l'âge de la femme. Les nombres pour ce tableau proviennent du Module sur la Mortalité des Enfants.

2 Calculé à partir des méthodes indirectes.

3 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN7=A, B, C.

4 Module sur la Mortalité des Enfants, nombre total de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 dernières années, CM12 = Oui.

5 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN8=21-26 OU 31-36.

6 Voir note de bas de page 4.

7 Module sur l'Anthropométrie, AN1. Les enfants dont le poids-pour-âge est hors des limites prévues et acceptables sont exclus du calcul de cet indicateur.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>SANTE</b>						
7. <i>Prévalence du retard de croissance</i>	Nombre d'enfants de moins de cinq ans qui se situent en-dessous de moins 2 écarts-type (-2 ET) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence du NCHS/WHO (modéré et sévère) et nombre d'enfants de moins de cinq ans se situant en-dessous de moins 3 écarts-type (-3 ET) par rapport à la médiane taille-pour-âge de la population de référence du NCHS/WHO (sé-vère)	Nombre total d'enfants de moins de cinq ans mesurés <sup>8</sup>	3		MG C	
8. <i>Prévalence de l'émaciation</i>	Nombre d'enfants de moins de cinq ans qui se situent en-dessous de moins 2 écarts-type (-2 ET) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de réf-erence du NCHS/WHO (modéré et sévère) et nombre d'enfants se situant en-dessous de moins 3 écarts-type (-3 ET) par rapport à la médiane poids-pour-taille de la population de référence du NCHS/WHO (sé-vère)	Nombre total d'enfants de moins de cinq ans pesés et mesurés <sup>9</sup>	3		MG C	
9. <i>Prévalence du faible poids à la naissance</i>	Nombre de naissances vivantes qui pèsent moins de 2500 grammes <sup>10</sup>	Nombre total des dernières naissances vi-vantes survenues au cours des 2 années ayant précédé l'enquête <sup>11</sup>	12		MG C	
10. <i>Proportion d'enfants pesés à la naissance</i>	Nombre de dernières naissances vivantes survenues au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont été pesées à la naissance <sup>12</sup>	Nombre total des dernières naissances vi-vantes survenues au cours des 2 années ayant précédé l'enquête <sup>13</sup>			MG C	
11. <i>Utilisation de l'eau potable salubre</i>	Nombre de membres des ménages <sup>14</sup> entrant dans les catégories définies comme eau potable salubre <sup>15</sup>	Nombre total de membres des ménages enquêtés	4	7 I 30	MG D SA 23	
12. <i>Utilisation des moyens d'assainissement pour le traitement des excréments</i>	Nombre de membres des ménages <sup>16</sup> entrant dans les catégories définies comme système sanitaire salubre <sup>17</sup>	Nombre total de membres des ménages enquêtés	5	7 I 31	MG D SA 23	

8 Module sur l'Anthropométrie, AN2. Les enfants dont la taille-pour-âge s'éloigne des limites acceptables sont exclus du calcul de cet indicateur.

9 Module sur l'Anthropométrie, AN1 et AN2. Les enfants dont le poids-pour-taille s'éloigne des limites acceptables sont exclus du calcul de cet indicateur.

10 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN11. Voir [www.childinfo.org](http://www.childinfo.org) pour de plus amples informations sur la tabulation de la prévalence du faible poids à la naissance.

11 Voir note de bas de page 4.

12 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN10=1.

13 Voir note de bas de page 4.

14 Cet indicateur est obtenu en pondérant le nombre de ménages par le nombre de résidents des ménages (HH11).

15 Module sur l'Eau et l'Assainissement, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 OU (WS1=91 ET WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).

16 Voir note de bas de page 14.

17 Module sur l'Eau et l'Assainissement, WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR				Autre
SANTE		WSC	MDG	WFFC		
13. Traitement de l'eau	Nombre de membres des ménages utilisant de l'eau traitée <sup>18</sup>			SA 23		
14. Évacuation adéquate des excréments des enfants	Nombre d'enfants de moins de trois ans dont les demi-selles ont été évacuées de manière adéquate <sup>19</sup>			SA 23		
15. Taux d'allaitement exclusif	Nombre d'enfants âgés de 0-5 mois exclusivement allaités au sein <sup>20</sup>	16		SA 5		
16. Taux d'allaitement continu	Nombre d'enfants de 12-15 mois et de 20-23 mois qui sont toujours allaités <sup>21</sup>	16		SA 5		
17. Taux d'alimentation de complément en temps opportun	Nombre d'enfants de 6-9 mois recevant le lait maternel et des aliments de complément <sup>22</sup>			SA 5		
18. Fréquence de l'alimentation de complément	Nombre d'enfants de 6-11 mois recevant le lait maternel et des aliments de complément au minimum autant de fois par jour que recommandé (deux fois/jour pour les enfants de 6-8 mois, 3 fois/jour pour les enfants de 9-11 mois <sup>23</sup> )			SA 5		

18 Module sur l'Eau et l'Assainissement, WS6=A, B, D, E.

19 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA13=1 OU 2.

20 Enfants toujours allaités (Module sur l'Allaitement, BF2=1) ET qu'aucune autre alimentation n'est donnée (la réponse doit être 2 (Non) pour BF3B, C, D, E, F, G et H; seul BF3A =1 est accepté).

21 Module sur l'allaitement, BF2=1.

22 Enfants toujours allaités (Module sur l'allaitement, BF2=1) ET aliments de complément donnés dans les dernières 24 heures (BF3H=1), même si d'autres substituts au lait maternel sont aussi donnés.

23 Module sur l'allaitement, (BF2=1 ET BF5>=2) pour les enfants âgés de 6-8 mois OU (BF2=1 ET BF5>=3) pour les enfants âgés de 9-11 mois.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR				WFCFC	Autre
SANTÉ							
19. <i>Alimentation adéquate des enfants</i>	Nombre d'enfants de 0-11 mois qui sont nourris de manière adéquate : enfants de 0-5 mois exclusivement allaités au sein et enfants de 6-11 mois qui reçoivent du lait maternel et ont mangé des aliments solides ou semi-solides le nombre de fois approprié (voir ci-dessus) la veille <sup>24</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 0-11 mois enquêtés			SA 5		
20. <i>Soins prénatals</i>	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans assistées au moins une fois pendant la grossesse par un personnel de santé qualifié <sup>25</sup> au cours des 2 années précédant l'enquête	Nombre total de femmes enquêtées, âgées de 15-49 ans, et qui ont une naissance survenue au cours des 2 années ayant précédé l'enquête <sup>26</sup>	9	11	SA 6		
21. <i>Prévalence contraceptive</i>	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans actuellement mariées ou en union qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode contraceptive (moderne ou traditionnelle) <sup>27</sup>	Nombre total de femmes enquêtées, âgées de 15-49 ans, qui sont actuellement mariées ou en union <sup>28</sup>	6	19c	SA 1 SA 3		
22. <i>Traitement antibiotique des enfants suspectés de pneumonie</i>	Nombre d'enfants de 0-59 mois suspectés d'avoir eu une pneumonie au cours des 2 dernières semaines qui ont reçu des antibiotiques <sup>29</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 0-59 mois suspectés d'avoir eu une pneumonie au cours des 2 dernières semaines <sup>30</sup>			SA 11		
23. <i>Recherche de soins en cas de suspicion d'une pneumonie</i>	Nombre d'enfants de 0-59 mois suspectés d'avoir eu une pneumonie au cours des 2 dernières semaines qui ont été conduits chez un prestataire de santé approprié <sup>31</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 0-59 mois suspectés d'avoir eu une pneumonie au cours des 2 dernières semaines <sup>32</sup>	24		SA 11		

24 Voir notes de bas de page 20 et 23.

25 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN2=A, B, C.

26 Voir note de bas de page 4.

27 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2 ET Module sur la Contraception, CP2=1.

28 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2.

29 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3) ET CA11=A.

30 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3).

31 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA5=1 ET CA6=1 ET (CA7=1 OU 3) ET le fait d'avoir consulté un prestataire de santé qualifié, CA8=1 ET (CA9=A-H, I-J, L-O) (exclure pharmacie).

32 Voir note de bas de page 30.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR				Autre
SANTÉ			WSC	MDG	WFFC	
24. Combustibles solides	Nombre de membres des ménages utilisant des combustibles solides (bois, charbon, résidus agricoles et crottin) pour la cuisson des aliments <sup>33</sup>	Nombre total de membres des ménages enquêtés		7 I 29	SA 11	
25. Couverture du BCG	Nombre d'enfants de 12-23-mois ayant reçu le vaccin du BCG avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire <sup>34</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois enquêtés	22		SA 7	
26. Couverture du VPO	Nombre d'enfants de 12-23 mois ayant reçu les 3 doses du vaccin VPO (VPO3) avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois enquêtés	22		SA 7	
27. Couverture du DTCocq	Nombre d'enfants de 12-23 mois ayant reçu les 3 doses du vaccin du DTCocq (DTCocq3) avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois enquêtés	22		SA 7	
28. Couverture de la rougeole	Nombre d'enfants de 12-23 mois <sup>35</sup> ayant reçu le vaccin contre la rougeole avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois <sup>35</sup> enquêtés	22	4 I 15	SA 7	
29. Couverture de l'Hépatite B	Nombre d'enfants de 12-23 mois vaccinés contre l'hépatite B avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois enquêtés			SA 7	
30. Couverture de la fièvre jaune	Nombre d'enfants de 12-23 mois vaccinés contre la fièvre jaune avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois enquêtés			SA 7	
31. Enfants complètement vaccinés	Nombre d'enfants de 12-23 mois <sup>36</sup> ayant reçu les vaccins DTCocq 1-3, VPO-1-3, BCG et contre la rougeole avant leur 1 <sup>er</sup> anniversaire	Nombre total d'enfants âgés de 12-23 mois <sup>36</sup> enquêtés			SA 7	

<sup>33</sup> Module sur les Caractéristiques du Ménage, HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, OU 11.

<sup>34</sup> Nombre total d'enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin BCG avant leur 1<sup>er</sup> anniversaire, selon que l'information provient de la carte de vaccination ou de la déclaration de la mère. Pour estimer le nombre d'enfants sans carte de vaccination qui ont reçu un vaccin, on a supposé que la proportion de vaccins reçus durant leur première année de vie était la même que chez les enfants ayant une carte de vaccination et vaccinés avant leur 1<sup>er</sup> anniversaire. La même approche est utilisée pour l'estimation de la couverture des autres antigènes : Polio, DTCocq3, rougeole, HepB et fièvre jaune (indicateurs 26-30).

<sup>35</sup> Dans les pays où le vaccin contre la rougeole est habituellement donné à l'âge de 15 mois, tels qu'en Amérique Latine, c'est le groupe d'âges 18-29 mois qui sera utilisé.

<sup>36</sup> Voir note de bas de page 35.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>SANTE</b>						
32. Enfants protégés contre le té-tanos néonatal	Nombre de mères d'enfants de 0-11 mois ayant reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique (TT) dans un intervalle approprié avant l'accouchement <sup>37</sup>	Nombre de mères d'enfants de 0-11-mois enquêtées <sup>38</sup>	22		SA 7	
33. Utilisation de la Thérapie de Réhydratation Orale (TRO)	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines précédant l'enquête et qui ont reçu une TRO et/ou des liquides-maison recommandés <sup>39</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée <sup>40</sup> au cours des 2 semaines précédant l'enquête	25		SA 11	
34. Traitement de la diarrhée à domicile	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines précédant l'enquête, qui ont reçu davantage de liquides ET et qui ont continué à manger un petit peu, la même quantité ou plus de nourriture <sup>41</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée <sup>42</sup> au cours des 2 semaines précédant l'enquête	23		SA 11	
35. Traitement TRO reçu ou apport d'aliments fluides, et poursuite de l'alimentation	Nombre d'enfants de 0-59 mois atteints de diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant reçu une TRO (SRO ou liquides-maison recommandés) ou des portions accrues d'aliments fluides ET, qui ont continué à s'alimenter <sup>43</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines précédant l'enquête <sup>44</sup>			SA 11	

37 Module sur l'Anatoxine Tétanique : le numérateur C'est toutes les mères ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années, et qui ont :

- (1) reçu deux doses de TT au cours de la grossesse (TT3>=2) OU
- (2) reçu une dose de TT au cours de la grossesse et au moins une dose avant cette grossesse (TT3=1 ET TT6>=1) OU
- (3) reçu au moins deux doses de TT avant la grossesse, dont la dernière dose moins de 3 ans avant la naissance (TT6>=2 ET (CM11-TT7{TT8})<3) OU
- (4) reçu trois doses au cours des 5 années précédant la grossesse (TT6>=3 ET (CM11-TT7{TT8})<5) OU
- (5) reçu quatre doses dont la dernière moins de 10 ans avant la grossesse (TT6>=4 ET ((CM11-TT7{TT8})<10) OU
- (6) reçu cinq doses ou plus à un moment quelconque (TT6>=5).

38 Naissances de l'année précédant l'enquête : c'est-à-dire si la date de l'interview (Panneau d'information des Femmes, WM6) moins la date de naissance de l'enfant (Module sur la Mortalité des Enfants, CM11) est inférieure à 1 an.

39 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA1=1 ET (CA2A=1 OU CA2B=1 OU CA2C=1).

40 Si CA1=8 (ne sait pas si l'enfant a eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines), l'enfant ne sera pas pris en compte dans le calcul des indicateurs suivants.

41 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA1=1 ET CA3 = 3 ET (CA4=3, 4, OU 5).

42 Voir note de bas de page 39.

43 Module sur les Soins des Enfants Malades, CA1=1 ET ((CA2A=1 OU CA2B=1 OU CA2C = 1) OU CA3 = 3) ET (CA4=3, 4, OU 5).

44 Voir note de bas de page 39.

INDICATEUR		NUMERATEUR		DENOMINATEUR			WSC	MDG	WFFC	Autre
SANTÉ										
36. Disponibilité de moustiquaires imprégnées d'insecticides (MI) dans les ménages		Nombre de ménages possédant au moins une moustiquaire permanente ou une moustiquaire traitée aux insecticides au cours des 12 derniers mois <sup>45</sup>		Nombre total de ménages enquêtés					SA 12	Abuja
37. Enfants de moins de 5 ans dormant sous une MI		Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois qui ont dormi sous une moustiquaire traitée aux insecticides la nuit dernière <sup>46</sup>		Nombre total d'enfants âgés de 0-59 mois enquêtés			6	I 22	SA 12	Abuja
38. Enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire		Nombre d'enfants âgés de 0-59 mois qui ont dormi sous une moustiquaire traitée aux insecticides la nuit dernière <sup>47</sup>		Nombre total d'enfants âgés de 0-59 mois enquêtés					SA 12	
39. Traitement du paludisme (chez les enfants de moins de 5 ans)		Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines, et qui ont été traités à l'aide d'antipaludéens appropriés dans les 24h qui ont suivi l'accès de fièvre <sup>48</sup>		Nombre total d'enfants de 0-59 mois déclarés comme ayant eu de la fièvre au cours des deux dernières semaines <sup>49</sup>			6	I 22	SA 12	

45 Module sur les Moustiquaires Traitées aux Insecticides (MI):

(1) Moustiquaires permanentes (TN3L1=1 OU TN3L2=1) OU

(2) Moustiquaires pré-imprégnées obtenues dans les 12 derniers mois ((TN3P1=1 OU TN3P2=1) ET TN6<12) OU

(3) Autres moustiquaires obtenues dans les 12 derniers mois et pré-imprégnées ((TN3O1=1 OU TN3O2=1 OU TN3X=1 OU TN3Z=1) ET TN5=1 ET TN6<12) OU

(4) Moustiquaires pré-imprégnées ou autres moustiquaires imprégnées dans les 12 derniers mois ((TN3P1=1 OU TN3P2=1 OU TN3O1=1 OU TN3O2=1 OU TN3X=1 OU TN3Z=1) ET TN7=1 ET TN8<12).

46 Module sur le Paludisme :

(1) Moustiquaires permanentes (ML12=11 OU 12) OU

(2) Moustiquaires pré-imprégnées obtenues dans les 12 derniers mois ((ML12=21 OU 22) ET ML11<12) OU

(3) Autres moustiquaires obtenues dans les 12 derniers mois et pré-imprégnées (ML11<12 ET ML13=1) OU

(4) Moustiquaires qui ont été imprégnées dans les 12 derniers mois (ML14=1 ET ML15 <12).

47 Module sur le Paludisme, ML10=1.

48 Module sur le Paludisme, ML1=1 ET (ML4=A-H OU ML7=A-H) ET (ML9=0 OU 1).

49 Module sur le Paludisme, ML1=1.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>SANTE</b>						
40. <i>Traitement préventif intermittent du paludisme (femmes enceintes)</i>	Nombre de femmes ayant reçu un traitement préventif du paludisme approprié (défini comme étant au moins 2 doses de SPI/Fansidar) lors de leur dernière grossesse ayant abouti à une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête <sup>50</sup>	Nombre total de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête <sup>51</sup>			SA 12	Abuja
41. <i>Consommation du sel iodé</i>	Nombre de ménages avec du sel testant 15 ppm ou plus d'iode/lodate <sup>52</sup>	Nombre total de ménages enquêtés <sup>53</sup>	14		SA 22	
42. <i>Enfants de moins de 5 ans recevant des suppléments en vitamine A</i>	Nombre d'enfants âgés de 6–59 mois recevant au moins une dose élevée de supplément en vitamine A lors des 6 derniers mois <sup>54</sup>	Nombre d'enfants âgés de 6–59 mois enquêtés	15		SA 22	
43. <i>Mères (en post-partum) recevant des suppléments en vitamine A</i>	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années précédant l'enquête qui ont reçu une dose élevée de supplément en vitamine A au cours des 8 semaines ayant suivi la naissance <sup>55</sup>	Nombre total de femmes enquêtées qui ont eu une naissance vivante survenue au cours des 2 dernières années précédant l'enquête <sup>56</sup>	15		SA 22	
44. <i>Contenu des soins prénatals</i>	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête et qui ont bénéficié de soins prénatals lors de leur dernière grossesse <sup>57</sup>	Nombre total de femmes enquêtées ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête <sup>58</sup>			SA 6	

50 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né pour les pays à prévalence plus ou moins élevée sur le paludisme, MN6B=A ET MN6D>=2.

51 Voir note de bas de page 4.

52 Module sur l'Iodation du Sel, SI1=3.

53 Si un ménage a du sel mais qu'il n'est pas testé (Module sur l'Iodation du Sel, SI1=7), il sera exclu du dénominateur pour le calcul de cet indicateur.

54 Module sur la Vitamine A, VA1=1 ET VA2<6.

55 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN1=1.

56 Voir note de bas de page 4.

57 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, les proportions sont calculées séparément : le nombre total de femmes qui ont été pesées, dont la tension a été prise, qui ont remis un échantillon d'urine, ou ont remis un échantillon de sang : MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.

58 Voir note de bas de page 4.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>SANTE</b>						
45. <i>Allaitement commencé à temps</i>	Nombre de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête et qui ont mis le nouveau-né au sein dans l'heure qui a suivi sa naissance <sup>59</sup>	Nombre total de femmes enquêtées ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années précédant l'enquête <sup>60</sup>			SA 5	
46. <i>Soutien pour l'apprentissage et l'encadrement de l'enfant</i>	Nombre d'enfants de 0-59 mois vivant dans des ménages dans lesquels un adulte a participé à au moins 4 activités pour promouvoir l'apprentissage et la préparation pour l'école au cours des 3 derniers jours <sup>61</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois enquêtés			SA 10	
47. <i>Soutien paternel pour l'apprentissage et l'encadrement de l'enfant</i>	Nombre d'enfants de 0-59 mois dont le père a participé à au moins une activité pour promouvoir l'apprentissage et la préparation pour l'école au cours des 3 derniers jours <sup>62</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois enquêtés			SA 10	
48. <i>Soutien pour l'apprentissage et l'encadrement de l'enfant : livres pour enfants</i>	Nombre de ménages possédant au moins trois livres pour enfants <sup>63</sup>	Nombre total de ménages enquêtés			SA 10	
49. <i>Soutien pour l'apprentissage et l'encadrement de l'enfant : autres livres</i>	Nombre de ménages possédant au moins trois autres livres (non pour enfants) <sup>64</sup>	Nombre total de ménages enquêtés			SA 10	
50. <i>Soutien pour l'apprentissage et l'encadrement de l'enfant : matériel ludique</i>	Nombre de ménages possédant au moins trois objets ludiques pour jouer <sup>65</sup>	Nombre total de ménages enquêtés			SA 10	
51. <i>Tuteur non-adulte</i>	Nombre d'enfants de 0-59 mois laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans au cours des sept derniers jours <sup>66</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois enquêtés			SA 10	

59 Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN13=000 (immédiatement) OU 100 (Moins d'1 heure).

60 Voir note de bas de page 4.

61 Module sur l'Enregistrement des Naissances et l'Education de la Petite Enfance, somme des réponses (BR8A-BR8F<>'Y') >=4.

62 Module sur l'Enregistrement des Naissances et l'Education de la Petite Enfance, somme des réponses (BR8A-BR8F='B') >=1.

63 Module optionnel sur le Développement de l'Enfant, CE1>=3.

64 Module optionnel sur le Développement de l'Enfant, CE2>=3.

65 Module optionnel sur le Développement de l'Enfant, CE3 contient 3 ou plus de A, B, C, D.

66 Module optionnel sur le Développement de l'Enfant, nombre de réponses où CE4>00 ou nombre de réponses où CE5>00.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>EDUCATION</b>						
52. Fréquentation du préscolaire	Nombre d'enfants âgés de 36-59 mois qui fréquentent l'un quelconque des programmes d'éducation préscolaire <sup>67</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 36-59 mois enquêtés	26		MGA	
53. Niveau de préparation pour l'école	Nombre d'enfants en 1 <sup>ère</sup> année d'études dans l'enseignement primaire qui ont fréquenté une école préscolaire l'année précédente <sup>68</sup>	Nombre total d'enfants en 1 <sup>ère</sup> année d'études dans l'enseignement primaire enquêtés <sup>69</sup>			MGA	
54. Taux d'admission (à l'école primaire)	Nombre d'enfants ayant l'âge d'aller à l'école primaire qui fréquentent – pour la première fois – la 1 <sup>ère</sup> année d'études dans l'enseignement primaire <sup>70</sup>	Nombre total d'enfants enquêtés ayant l'âge d'aller à l'école primaire	6		MGB	
55. Taux net de fréquentation du cycle primaire	Nombre d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle primaire qui fréquentent une école primaire ou secondaire <sup>71</sup>	Nombre total d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle primaire enquêtés	6	2 16	MGB	
56. Taux net de fréquentation du cycle secondaire	Nombre d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle secondaire qui fréquentent une école secondaire ou le supérieur <sup>72</sup>	Nombre total d'enfants ayant l'âge d'entrer au cycle secondaire enquêtés			MGC	
57. Taux de survie des études primaires	Proportion d'enfants commençant la 1 <sup>ère</sup> année d'études dans l'enseignement primaire et achevant la cinquième (dernière) année de ce cycle <sup>73</sup>		6	2 17	MGD	
58. Taux de transition	Nombre d'enfants en dernière année du cycle primaire pendant l'année scolaire précédente qui sont passés au cycle secondaire <sup>74</sup>	Nombre d'enfants en dernière année du cycle primaire pendant l'année scolaire précédente <sup>75</sup>			MGC	

67 Module sur l'Enregistrement des Naissances et l'Education de la Petite Enfance, UF11=3-4 ans ET BR6=1.

68 Module sur l'Education, ED6 Niveau=1, Année/Classe=1 ET ED8 Niveau=0.

69 Module sur l'Education, ED6 Niveau=1, Année/Classe=1.

70 Sélectionner tous les enfants ayant l'âge normal d'entrée à l'école primaire (par exemple, HL5=6) ; Module sur l'Education, ED4=1 ET ED6 Niveau=1, Année/Classe=1.

71 Sélectionner tous les enfants ayant l'âge normal de fréquentation du niveau d'enseignement primaire (par exemple, HL5=6-11) ; Module sur l'Education, ED6 Niveau=1 OU 2.

72 Sélectionner tous les enfants ayant l'âge normal de fréquentation du niveau d'enseignement secondaire (par exemple, HL5=12-17) ; Module sur l'Education, ED6 Niveau = 2 OU 3.

73 Cet indicateur est calculé à partir des probabilités de transition pour une cohorte d'enfants issue de l'échantillon, et tirés des questions ED4 à ED8 du Module sur l'Education.

74 Module sur l'Education, ED8 Niveau =1, Année/Classe = (dernière classe/année de l'école primaire, par exemple, 6) ET ED6 Niveau =2.

75 Module sur l'Education, ED8 Niveau =1, Année/Classe = (dernière classe/année de l'école primaire, par exemple, 6).

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>EDUCATION</b>						
59. Taux d'achèvement du cycle primaire	Nombre d'enfants (de tous âges) fréquentant la dernière année du cycle primaire (redoublants exclus) <sup>76</sup>	Nombre total d'enfants enquêtés ayant l'âge normal pour la dernière classe du niveau d'enseignement primaire <sup>77</sup>	6	2 17b	MG D	
60. Taux d'alphabétisation des adultes	Nombre de femmes de 15-24 ans capables de lire une courte phrase simple sur la vie quotidienne <sup>78</sup>	Nombre total de femmes de 15-24 ans enquêtées	7	2 18	MG F	
61. Indice de Parité entre les Sexes (IPS)	Proportion de filles dans les niveaux primaire et secondaire d'enseignement <sup>79</sup>	Proportion de garçons dans les niveaux primaire et secondaire d'enseignement <sup>80</sup>		3 19	MG C	

76 Module sur l'Education, ED6 Niveau =1, Année/Classe = (dernière classe/année de l'école primaire, par exemple, 6) ET ED8 Niveau =1, Année/Classe <> (dernière classe/année de l'école primaire).

77 Sélectionner tous les enfants ayant l'âge normal pour la dernière année/classe de l'école primaire, par exemple, HL5=11.

78 Panneau d'information des Femmes, WM14=3 OU WM11=2 OU 3.

79 Sélectionner les filles, HL4=2, calculer le taux net de fréquentation en utilisant le Module de l'Education, primaire ED6=1 ; secondaire ED6=2 ; supérieur ED6=3.

80 Sélectionner les garçons, HL4=1, calculer le taux net de fréquentation en utilisant le Module de l'Education, primaire ED6=1 ; secondaire ED6=2 ; supérieur ED6=3.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>PROTECTION DE L'ENFANT</b>						
62. Enregistrement des naissances	Nombre d'enfants de 0-59 mois dont la naissance a été enregistrée <sup>81</sup>	Nombre total d'enfants de 0-59 mois enquêtés			SA 1	
63. Prévalence de l'excision/mutilation génitale féminine (E/MGF)	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans déclarant avoir subi une des formes d'excision/mutilation génitale féminine <sup>82</sup>	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans enquêtées			SA 9	
64. Prévalence d'une forme extrême d'E/MGF	Nombre de femmes de 15-49 ans déclarant avoir subi une forme extrême d'excision/mutilation génitale féminine (par exemple, l'infibulation) <sup>83</sup>	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans enquêtées			SA 9	
65. Prévalence de l'E/MGF chez les filles	Nombre de femmes de 15-49 ans déclarant avoir fait subir au moins à l'une de leurs filles une forme d'excision/mutilation génitale féminine <sup>84</sup>	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans enquêtées qui ont au moins une fille vivante <sup>85</sup>			SA 9	
66. Approbation de l'E/MGF	Nombre de femmes de 15-49 ans favorables à la poursuite de la pratique de l'E/MGF <sup>86</sup>	Nombre de femmes âgées de 15-49 ans enquêtées			SA 9	
67. Mariage avant 15 ans, 18 ans	Nombre de femmes de 15-49 ans mariées ou en union pour la première fois avant d'avoir eu exactement 15 ans <sup>87</sup> et 18 ans <sup>88</sup> , par groupes d'âge	Nombre total de femmes de 15-49 ans mariées ou en union enquêtées, par groupes d'âge			SA 9	
68. Jeunes femmes de 15-19 ans actuellement mariées/en union	Nombre de femmes de 15-19 ans actuellement mariées ou en union <sup>89</sup>	Nombre total de femmes de 15-19 ans mariées ou en union enquêtées			SA 9	

81 Module sur l'Enregistrement des Naissances et l'Education de la Petite Enfance, BR1=1 OU BR2=1.

82 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG3=1.

83 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG4=1 ET FG6=1.

84 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG9>=01.

85 Module sur la Mortalité des Enfants, CM4+CM6>=1.

86 Module optionnel sur les Mutilations Génitales Féminines/Excision, FG16=1.

87 Module sur les Unions/Mariage, (MA6-WM8<15) OU (MA8<15). Calculer en utilisant les codes imputés en mois d'âge et en siècle de date – ou CMC (century month codes), dans un logiciel d'analyses. Désagréger par groupes d'âge de 15-19 ans à 45-49 ans.

88 Module sur les Unions/Mariage, (MA6-WM8<18) OU (MA8<18). Calculer en utilisant les CMC dans un logiciel d'analyses. Désagréger par groupes d'âge de 20-24 ans à 45-49 ans.

89 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>PROTECTION DE L'ENFANT</b>						
69. Différence d'âges des conjoints	Nombre de femmes de 15-19 ans et de 20-24 ans actuellement mariées ou en union dont la différence d'âges avec leur conjoint est de 10 ans, voire plus <sup>90</sup>	Nombre total de femmes de 15-19 ans et de 20-24 ans enquêtées actuellement mariées ou en union <sup>91</sup>			SA 9	
70. Polygamie	Nombre de femmes de 15-49 ans mariées en situation polygamique <sup>92</sup>	Nombre total de femmes de 15-49 ans enquêtées actuellement mariées ou en union <sup>93</sup>			SA 9	
71. Travail des enfants	Nombre d'enfants âgés de 5-14 ans qui travaillent actuellement <sup>94</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 5-14 ans enquêtés			SA 35	
72. Étèves ouvriers	Nombre d'enfants de 5-14 ans impliqués dans le travail des enfants qui fréquentent l'école <sup>95</sup>	Nombre total d'enfants de 5-14 ans impliqués dans le travail des enfants <sup>96</sup>			SA 36	
73. Ouvriers élèves	Nombre d'enfants de 5-14 ans fréquentant l'école qui sont impliqués dans le travail des enfants <sup>97</sup>	Nombre total d'enfants de 5-14 ans fréquentant l'école <sup>98</sup>			SA 36	

90 Module sur les Unions/Mariage, MA2<>98 ET ((MA2-(WM6-WM8)>=10) OU (MA2-WM9>=10)).

91 Module sur les Unions/Mariage, exclure les femmes dont MA2=98.

92 Questions du Module optionnel sur les Unions/Mariage pour les pays dans lesquels existe la polygamie, MA2A=1.

93 Module sur les Unions/Mariage, MA1=1 OU 2.

94 Module sur le Travail des Enfants :

(1) Activité Economique : ((CL3=1 OU CL3=2 OU CL8=1) ET CL4+CL9>=Heures Minimales) OU

(2) Travaux ménagers : (CL6=1 ET CL7>=28 Heures)

Pour les enfants âgés de 5-11 ans, Heures minimales = 1 ; pour les enfants âgés de 12-14 années, Heures Min.= 14.

Remarque : Cet indicateur doit être calculé séparément pour les enfants qui travaillent en dehors de la maison, rémunérés ou non rémunérés.

95 Module sur le Travail des Enfants, tel que défini en note de bas de page 94 ET Module sur l'Education, ED4 =1.

96 Module sur le Travail des Enfants, tel que défini en note de bas de page 94.

97 Modules sur l'Education et sur le Travail des Enfants, Module sur le Travail des Enfants, tel que défini en note de bas de page 94 ET Module sur l'Education, ED4 =1.

98 Module sur l'Education, ED4=1.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>PROTECTION DE L'ENFANT</b>						
74. <i>Discipline de l'enfant</i>	Nombre d'enfants âgés de 2-14 ans subissant (1) uniquement des punitions non violentes ; (2) une agression psychologique en guise de punition ; (3) un châtement corporel mineur (C) ; 4) un châtement corporel sévère <sup>99</sup>	Nombre total d'enfants de 2-14 ans sélectionnés et enquêtés <sup>100</sup>			SA 2	

99 Module optionnel sur la Discipline de l'Enfant.

- (1) (CD12A=1 OU CD12B=1 OU CD12E=1) ET (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J, ET CD12K=2).
- (2) (CD12D=1 OU CD12H=1)
- (3) (CD12C=1 OU CD12F=1 OU CD12G=1 OU CD12J=1)
- (4) (CD12I=1 OU CD12K=1).

100 Remarquez qu'un seul enfant de 2-14 ans est sélectionné par ménage pour le Module sur la Discipline de l'Enfant.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>VH/SIDA</b>						
75. Prévalence d'orphelins	Nombre d'enfants âgés de 0-17 ans dont au moins l'un des deux parents biologiques est décédé <sup>101</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 0-17 ans enquêtés			MG C	
76. Prévalence d'enfants vulnérables	Nombre d'enfants de 0-17 ans dont l'un des parents souffre d'une maladie chronique, ou qui vivent dans un ménage comptant un adulte de 18-59 ans qui a été gravement malade ou qui est décédé au cours des 12 derniers mois <sup>102</sup>	Nombre total d'enfants de 0-17 ans enquêtés			MG C	
77. Fréquentation scolaire des orphelins par rapport aux non-orphelins	Proportion des orphelins de père et de mère âgés de 10-14 ans fréquentant l'école <sup>103</sup>	Proportion des enfants âgés de 10-14 ans, dont tous les deux parents sont en vie, qui vivent avec au moins l'un de leurs deux parents et fréquentant l'école <sup>104</sup>		6 I 20	SA 10	UN- GASS
78. Conditions d'accueil des enfants	Nombre d'enfants âgés de 0-17 ans ne vivant avec aucun de leurs deux parents biologiques <sup>105</sup>	Nombre total d'enfants de 0-17 ans enquêtés			SA 11	
79. Malnutrition chez les orphelins et les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA	Proportion d'orphelins ou d'enfants rendus vulnérables (OEV) âgés de 0-59 mois qui souffrent d'émaciation modérée ou sévère, parmi tous les OEV de moins de 5 ans qui ont été pesés <sup>106</sup>	Proportion des enfants âgés de 0-59 mois qui ne sont pas considérés comme des OEV qui souffrent d'émaciation modérée ou sévère, parmi tous les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas considérés comme OEV qui ont été pesés <sup>107</sup>			MG C	

101 Module d'Enregistrement du Ménage. HL9=2 OU HL11=2.

102 Module d'Enregistrement du Ménage Elargi et Module des OEV, (OV4=1 OU HL8A=1 pour chaque membre du ménage) OU (HL10A=1 OU HL12A=1 pour l'enfant en question).

103 Module d'Enregistrement du Ménage. le numérateur est (HL9=2 OU HL11=2) ET ED4=1, le dénominateur est (HL9=2 OU HL11=2).

104 Module d'Enregistrement du Ménage. le numérateur est (HL9=1 ET HL11=1) ET (HL10<=00 OU HL12<=00)) ET ED4=1, le dénominateur est (HL9=1 ET HL11=1) ET (HL10<=00 OU HL12<=00)).

105 Module d'Enregistrement du Ménage. (HL9=2 OU HL10=00) ET (HL11=2 OU HL12=00), c'est-à-dire que la mère n'est plus en vie OU qu'elle ne vit pas dans le même ménage ET que le père n'est plus en vie OU qu'il ne vit pas dans le même ménage.

106 Voir note de bas de page 101 pour la définition de "orphelin" et note de bas de page 102 pour la définition d'"enfant vulnérable". La méthode de calcul pour l'émaciation sera la même que celle utilisée pour l'indicateur 6. Les enfants dont les poids-pour-âge sont hors des limites sont exclus pour ce calcul.

107 La prévalence de l'émaciation est calculée pour tous les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas considérés comme orphelins OU vulnérables selon les notes de bas de page 101 et 102.

INDICATEUR		NUMERATEUR		DENOMINATEUR				WSC	MDG	WFFC	Autre
VIH/SIDA											
80. Rapports sexuels précoces chez les orphelins et les enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA	Proportion d'orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA (OEV) âgés de 15-17 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, parmi tous les OEV de 15-17 ans enquêtés <sup>108</sup>	Proportion d'enfants non OEV âgés de 15-17 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, parmi tous les enfants non OEV de 15-17 ans enquêtés <sup>109</sup>							MG C		
81. Soutien extérieur aux orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA	Nombre d'orphelins et d'enfants vulnérables (OEV) de moins de 18 ans dont la famille a reçu un soutien extérieur gratuit pour des soins de base à l'enfant <sup>110</sup>	Nombre d'orphelins et d'enfants vulnérables (OEV) de moins de 18 ans enquêtés <sup>111</sup>							MG C		
82. Connaissances générales sur la prévention du VIH chez les jeunes	Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans ayant à la fois correctement identifié deux méthodes de prévention du VIH par voie sexuelle et rejeté trois principales idées fausses sur la transmission du virus <sup>112</sup>	Nombre total de jeunes femmes de 15-24 ans enquêtées					6 I 19b	SA 2	UN-GASS		

108 Voir les notes de bas de page 101 et 102 pour la définition des orphelins et enfants vulnérables (OEV). Sélectionner les OEV âgés de 15-17 ans pour lesquels les critères suivants sont vrais : Module sur le Comportement Sexuel, SB1<=0 ET (SB1<15 (rapport sexuel avant 15 ans) OU (SB1=95 (1er rapport sexuel au mariage) (ET ((MA6-WM8)<15) OU MA8<15)) (mariage avant l'âge de 15 ans)).

109 La proportion ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans est calculée comme dans la note de bas de page 108 pour tous les enfants de 15-17 ans qui ne sont pas considérés comme orphelins OU vulnérable selon les notes de bas de page 101 et 102.

110 Module sur les Orphelins et Enfants Rendus Vulnérables par le VIH/SIDA, orphelins OU enfants vulnérables (tels que définis dans les notes de bas de page 101 et 102) qui vivent dans des ménages ayant reçu au moins l'un des services suivants pour l'enfant :

Soutien médical au cours des 12 derniers mois, OV10=1 OU

Soutien émotionnel ou psychologique au cours des 3 derniers mois, OV12=1 OU

Autre soutien social, y compris le soutien matériel, au cours des 3 derniers mois, OV14=1 OU OV16=1 OU

Soutien pour la scolarité au cours des 12 derniers mois, OV18=1.

111 Voir notes de bas de page 101 ET 102 pour la définition d'orphelins et d'enfants vulnérables.

112 Module sur le VIH/SIDA, (HA2=1 ET HA4=1) (Remarque : ces réponses reflètent une bonne compréhension de la manière dont le VIH peut être évité) ET (HA3=2 ET HA5=2 ET HA8=1) (Remarque : ces réponses reflètent un rejet de trois idées erronées les plus courantes sur la transmission du VIH.)

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR				WFC	MDG	WFFC	Autre
VIH/SIDA									
83. Utilisation de préservatifs avec le partenaire non cohabitant	Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans affirmant avoir utilisé un préservatif lors des rapports sexuels avec leur dernier partenaire, non marital non cohabitant au cours des 12 derniers mois <sup>113</sup>	Nombre total de jeunes femmes de 15-24 ans enquêtées qui ont eu un partenaire sexuel non marital non cohabitant au cours des 12 derniers mois <sup>114</sup>					6 I 19a	SA 2	UN-GASS
84. Âge au premier rapport sexuel chez les jeunes	Nombre de femmes de 15-19 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans <sup>115</sup>	Nombre total de femmes de 15-19 ans enquêtées						SA 2	
85. Rapport sexuel à haut risque au cours de l'année écoulée	Nombre de femmes de 15-24 ans sexuellement actives ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire non marital non cohabitant au cours des 12 derniers mois <sup>116</sup>	Nombre total de femmes de 15-24 ans sexuellement actives au cours des 12 derniers mois <sup>117</sup>						SA 4	
86. Attitudes de tolérance vis-à-vis de personnes vivant avec le VIH/SIDA	Nombre de femmes qui feraient preuve de tolérance envers les personnes vivant avec le VIH si elles se trouvaient dans les quatre situations mentionnées <sup>118</sup>	Nombre total de femmes enquêtées						SA 7	
87. Femmes connaissant des centres de dépistage du VIH	Nombre de femmes qui déclarent connaître un endroit où se faire tester <sup>119</sup>	Nombre total de femmes enquêtées						MG B	
88. Femmes ayant subi le test de dépistage du VIH	Nombre de femmes qui déclarent avoir subi un test de dépistage du VIH <sup>120</sup>	Nombre total de femmes enquêtées						MG B	

<sup>113</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET ((SB3=1 ET SB4<>1) OU (SB7=1 ET SB8<>1)). Les résultats de cet indicateur doivent être présentés désagrégés par groupes d'âges 15-19, 20-24 et 15-24 ans.

<sup>114</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET (SB4<>1 OU SB8<>1).

<sup>115</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB1<>0 ET (SB1<15 (rapports sexuels avant l'âge de 15 ans) OU (SB1=95 (1er rapport sexuel au mariage) ET ((MA6-WM8)<15) OU MA8<15)) (mariage avant l'âge de 15 ans)).

<sup>116</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET (SB4<>1 OU SB8<>1).

<sup>117</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4.

<sup>118</sup> Module sur le VIH/SIDA, HA10=1 ET HA11=1 ET HA12=2 ET HA13=1.

<sup>119</sup> Module sur le VIH/SIDA, HA18=1 OU HA15=1 OU Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né., MN5=1.

<sup>120</sup> Module sur le VIH/SIDA et Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, HA15=1 OU MN5=1.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>VIH/SIDA</b>						
89. Connaissance de la transmission mère-enfant du VIH	Nombre de femmes ayant correctement identifié tous les trois modes de transmission verticale (mère à enfant) du VIH <sup>121</sup>	Nombre total de femmes enquêtées			MG B	
90. Prise en charge en matière de conseils dans le cadre de la PTME	Nombre de femmes ayant donné naissance au cours des 24 derniers mois et ayant reçu des soins prénatals déclarant avoir reçu des conseils sur le VIH/SIDA pendant la visite prénatale <sup>122</sup>	Nombre total de femmes enquêtées ayant donné naissance au cours des 24 derniers mois			MG B	
91. Prise en charge pour le test de dépistage dans le cadre de la PTME	Nombre de femmes ayant donné naissance au cours des 24 derniers mois et ayant reçu des soins prénatals déclarant avoir reçu les résultats de leur test du VIH pendant la visite prénatale <sup>123</sup>	Nombre total de femmes ayant donné naissance au cours des 24 derniers mois enquêtées			MG B	
92. Mélange des âges entre les partenaires sexuels	Nombre de jeunes femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire de 10 ans leur aîné, voire plus <sup>124</sup>	Nombre total de jeunes femmes de 15-24 ans sexuellement actives enquêtées <sup>125</sup>			SA 4	

<sup>121</sup> Module sur le VIH/SIDA, HA9A=1 ET HA9B=1 ET HA9C=1.

<sup>122</sup> Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN4=1.

<sup>123</sup> Module sur la Santé de la Mère et du Nouveau-né, MN6=1.

<sup>124</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4 ET ((SB5-WM9)>=10 OU (SB9-WM9)>=10)). Cet indicateur inclut tous les partenaires sexuels, que ce partenaire soit marital/cohabitant OU non-marital/non-cohabitant.

<sup>125</sup> Module sur le Comportement Sexuel, SB2<>4.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>INDICATEURS ADDITIONNELS</b>						
93. Sécurité de la propriété	Nombre de membres de ménages vivant dans des ménages urbains dépourvus de tout document d'occupation officiel ou appréhendant une expulsion de leur habitation <sup>126</sup>	Nombre de membres de ménages vivant dans les ménages urbains enquêtés				
94. Durabilité du logement	Nombre de membres de ménages vivant dans des habitations urbaines qui ne sont pas considérées comme durables <sup>127</sup>	Nombre de membres de ménages vivant dans les ménages urbains enquêtés				
95. Ménages résidant dans des taudis	Nombre de membres de ménages vivant dans des taudis urbains <sup>128</sup>	Nombre de membres de ménages vivant dans les ménages urbains enquêtés <sup>129</sup>		7		

126 Module sur la Sécurité de la Propriété et la Durabilité du Logement, (HC15B<=>1 ET HC15C<=>A,B ET HC15D<=>1) OU HC15F=2.

127 Module sur la Sécurité de la Propriété et la Durabilité du Logement et Module sur les Caractéristiques du Ménage :

- (1) Principal matériel du sol en nature (HC3=11-19) et pauvres conditions de l'habitation (deux OU plus de HC15I=A-F), OU
- (2) Exposée aux accidents du fait des problèmes suivants : HC15J=A ET B, OU
- (3) Située dans un endroit à risque, (quatre OU plus de HC15H=A-I).

128 Module sur les Caractéristiques du Ménage et Module sur la Sécurité de la Propriété et la Durabilité du Logement, en ne sélectionnant que les ménages urbains, HH6=1 :

- (1) Absence d'habitation en bon état, voir 94 (note de bas de page 127), OU
- (2) Manque de sécurité de la propriété, voir indicateur 93 (note de bas de page 126), OU
- (3) Promiscuité, nombre de personnes par chambre à coucher (HH11/HC2) > 3, OU
- (4) Manque d'accès à une source d'eau potable, voir indicateur 11, OU
- (5) Manque d'accès à des toilettes améliorées, voir indicateur 12.

129 Panneau d'Information du Ménage, HH6=1.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>INDICATEURS ADDITIONNELS</b>						
96. Source d'approvisionnement	Nombre d'enfants (ou de ménages) dont les approvisionnements se font auprès de fournisseurs du service public <sup>130</sup> , présenté individuellement par type de provision : moustiquaires imprégnées d'insecticides, sels de réhydratation orale, antibiotiques et antipaludéens	Nombre total d'enfants (ou de ménages) qui se sont approvisionnés en ce type de provision <sup>131</sup>				
97. Coût d'approvisionnement	Coût médian des approvisionnements obtenus <sup>132</sup> , présenté individuellement pour chaque type de provision : moustiquaires imprégnées d'insecticides, sels de réhydratation orale, antibiotiques et antipaludéens, et par type de fournisseur (public ou privé)	Nombre total d'enfants (ou de ménages) qui se sont approvisionnés en ce type de provision <sup>133</sup>				

130 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

- (1) Source des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45 ET TN3A=11-19
- (2) Source des sels de réhydratation orale, CA4B=11-19
- (3) Source des antibiotiques, CA11B=11-19
- (4) Source des antipaludéens, ML9A=11-19.

131 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

- (1) Utilisation des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45
- (2) Utilisation des sels de réhydratation orale, CA2A=1
- (3) Utilisation des antibiotiques, CA11=A
- (4) Utilisation des antipaludéens, ML4=A-H OU ML7=A-H.

132 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

- (1) Coût des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45, ET TN3B
- (2) Coût des sels de réhydratation orale, CA4C
- (3) Coût des antibiotiques, CA11C
- (4) Coût des antipaludéens, ML9B.

133 Module sur les Sources et le Coût des Produits :

- (1) Utilisation des moustiquaires imprégnées tels que définis dans la note de bas de page 45
- (2) Utilisation des sels de réhydratation orale, CA2A=1
- (3) Utilisation des antibiotiques, CA11=A
- (4) Utilisation des antipaludéens, ML4=A-H OU ML7=A-H.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
INDICATEURS ADDITIONNELS						
98. Besoins non satisfaits en matière de contraception	Nombre de femmes actuellement mariées ou en union, qui sont fécondes <sup>134</sup> et veulent espacer <sup>135</sup> leurs naissances ou limiter <sup>136</sup> le nombre de leurs enfants et qui n'utilisent pas actuellement la contraception	Nombre total de femmes enquêtées qui sont actuellement mariées ou en union <sup>137</sup>				
99. Demande satisfaite en matière de contraception	Nombre de femmes actuellement mariées ou en union, qui utilisent actuellement la contraception <sup>138</sup>	Nombre total de femmes enquêtées qui sont actuellement mariées ou en union et soit ont un besoin non satisfait en matière de contraception <sup>139</sup> , soit utilisent actuellement la contraception <sup>140</sup>				
100. Attitudes vis-à-vis de la violence conjugale	Nombre de femmes qui estiment qu'il est justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme au moins dans les circonstances suivantes : (1) elle sort sans le lui dire <sup>141</sup> , (2) elle néglige les enfants <sup>142</sup> , (3) elle discute ses opinions <sup>143</sup> , (4) elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui <sup>144</sup> , (5) elle brûle la nourriture <sup>145</sup> .	Nombre total de femmes enquêtées			SA6	
101. Handicap de l'enfant	Nombre d'enfants âgés de 2-9 ans et ayant au moins l'un des handicaps suivants <sup>146</sup> : (1) retard sérieux pour s'asseoir, se tenir debout ou marcher, (2) difficultés pour voir la lumière du jour ou à la tombée de la nuit, (3) troubles de l'audition, (4) difficultés à comprendre ce qu'on lui dit, (5)	Nombre total d'enfants de 2-9 ans enquêtés			SA3	

134 Module sur les Unions/Mariage : MA1=1 OU 2.

135 Module sur la Contraception et les Besoins non satisfaits : (CP1=1 ET CP1A=2) OU (CP1<>1 ET CP4A=1 ET (CP4C=>=2 ans OU CP4C=995)).

136 Module sur la Contraception et les Besoins non satisfaits : (CP1=1 ET CP1A=3) OU (CP1<>1 ET CP4A=2).

137 Module sur les Unions/Mariage : MA1=1 OU 2.

138 Module sur les Unions/Mariage et Module sur la Contraception : (MA1=1 OU 2) ET CP2=1.

139 Voir indicateur 98.

140 Module sur les Unions/Mariage et Module sur la Contraception : (MA1=1 OU 2) ET CP2=1.

141 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1A=1.

142 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1B=1.

143 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1C=1.

144 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1D=1.

145 Module sur les Attitudes vis-à-vis de la Violence Conjugale : DV1E=1.

146 Module sur l'Handicap de l'Enfant : DA3=1 OU DA4=1 OU DA5=1 OU DA6=2 OU DA7=1 OU DA8=1 OU DA9=2 OU DA10=2 OU DA13=1.

INDICATEUR	NUMERATEUR	DENOMINATEUR	WSC	MDG	WFFC	Autre
<b>INDICATEURS ADDITIONNELS</b>						
	<p>difficultés pour marcher, ou bouger les bras, ou manque de force et/ou a une raideur dans le bras ou les jambes, (6) pi- que parfois des crises, devient raide ou perd connaissance, (7) n'apprend pas à faire des choses comme les autres en- fants de son âge, (8) ne peut se faire comprendre en par- lant, ne peut dire des choses compréhensibles, (9) compa- ré à d'autres enfants du même âge, paraît mentalement ar- riéré ou lent d'esprit</p>					